EFFECT OF *Trichoderma* spp. ON MAIZE INFECTIOUS BY *FUSARIUM*

AL-Ahmed, J.¹ and A. A. Al-Rafdi²

¹ Fac. of Agric., Alfurat Univ., AL Raqqa, Syria

² Dep. Plant Protection, Fac. of Agric., Alfurat Univ., Dier ezzor. Corresponding author: alrafdi@gmail.com

تأثير فطر التريكوثيرما على نباتات الذرة الصفراء المصابة بفطر الفوزاريوم
جمال الأحمد¹ و أحمد محمد الرفدي²
¹ كلية الزراعة - جامعة الفرات - الرقة - سوريا
² قسم وقاية النبات - كلية الزراعة - جامعة الفرات - دير الزور.

الملخص

تم عزل الفطريات المسببة لذبول وعفن حبوب الذرة الصفراء *Fusarium moniliforme* و *F.graminearum* من حبوب الذرة الصفراء المصابة وتعريفهما ميكروسكوبياً , وتم اختبار القدرة المرضية للعزلات وقد أظهرت العزلات قدرات مرضية متباينة . كما تم اختبار التضاد الفطري للفطر *Trichoderma harzianum* كعزلة حية ومستحضر تجاري بيوكونت تحت الظروف المعملية والحقلية. وجدت فروق معنوية واضحة في معدل النمو القطري للمعاملات معملياً إذ بلغت نسبة التثبيط (76.4%) للبيوكونت و(72%) للعزلة *T.harzianum* ضد الفطر *F.moniliforme* فيما بلغت (73%) للبيوكونت و (70%) للعزلة *T.harzianum* ضد الفطر *F.graminearum* . أما تحت الظروف الحقلية فقد وجد تحسناً معنوياً في نسبة الانبات عند معاملة الحبوب بعزلة التريكوثيرما والبيوكونت معاً (79.3%) مقارنة بنسبة (67.6%) في معاملة الشاهد. كما تبين وجود انخفاض في نسبة الإصابة من (62.2%) في الحبوب المعدية صناعياً بالفوزاريومات إلى (57.9%) في الحبوب المعدية صناعياً والمعاملة بالبيوكونت , كما لوحظ ازدياد الانتاجية للصنف غوطة 82 من (55.0) كجم/هكتار في البذور غير المعاملة إلى (57.6) كجم/هكتار من الحبوب المعاملة بالتريكوثيرما والبيوكونت ومن (46.2) كجم/هكتار في الحبوب المعدية بالفوزاريوم إلى (47.6) كجم/هكتار في الحبوب المعدية والمعاملة بالبيوكونت.

كلمات مفتاحية: *F.graminearum* , *F.moniliforme* , التريكوثيرما , البيوكونت , الذرة الصفراء

المقدمة

تعتبر الذرة الصفراء من أهم محاصيل الحبوب الغذائية والصناعية والعلفية عالمياً وتأتي في المرتبة الثالثة بعد القمح والأرز وتستخدم في تغذية الإنسان والحيوان وفي الصناعة (الخليفة و عبيان، 2003). وحسب احصائيات منظمة الأغذية والزراعة العالمية FAO لعام 2010 تبين أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المركز الأول من حيث المساحة المزروعة والإنتاج الكلي أما على مستوى الوطن العربي فقد احتلت مصر المركز الأول من حيث المساحة المزروعة والإنتاج , أما في القطر العربي السوري فقد بلغت المساحة المزروعة 37900 هكتار أعطت 133100 طن بمردود قدره 35119 كجم/هكتار (FAO 2010). وتعتبر الذرة واحدة من حبوب الغذاء الأكثر أهمية بسبب تحويلها الفعال للمادة الجافة إلى لحم , حليب , أو بيض بالمقارنة بالحبوب الأخرى (Sprague and Dudley, 1988), ولكن من جانب آخر قد تهاجم الذرة بكتائنات حية مختلفة مثل الفطر *Fusarium spp* الذي يسبب خسائر اقتصادية هائلة في إنتاج المحصول والغلة وصناعة الطعام بواسطة تدمير النباتات في الحقل و خلال التخزين (Macdonald and Chapme., 1997), بالإضافة إلى أنها تنتج أعداد متنوعة من الميكوتوكسينات التي غالباً تكون سامة للإنسان و حيوان المزرعة (Sydenham et al., 1990 and Ross et al., 1992) فعلى سبيل المثال المثال *F. moniliforme* Sheld (*F. verticilliods*) يعتبر المسبب الفطري الأكثر تكراراً الذي يهاجم حبوب الذرة على الكيزان مسبباً أعفان الحبوب ومن الممكن أن يصيب هذا الفطر البادرات قبل الظهور فوق سطح التربة مسبباً موت قبل الانبات للبادرات أو بعد الانبات مسبباً ذبول بعد الانبات (Bacon et al 2001). كذلك الفطر *Fusarium graminearum* Schwabe يسبب أعفاناً للكيزان والسوق و لفحة البادرات وذبولها واصفرارها ووقف نموها بسبب ضعف المجموع الجذري (Sutton.,1982).

إن حماية النباتات من مسببات المرضية المحمولة بالتربة تتركز بشكل كبير على المبيدات الفطرية . كما أن استخدام المبيدات الفطرية لمكافحة مسببات المرضية المحمولة بالتربة تبدو غير مرغوبة لأسباب إقتصادية وبيئية (Bunchenauer, 1998) . من هنا جاءت الأهمية لاستخدام طرق مكافحة بديلة للحفاظ على أعداد الفطريات المحمولة بالتربة بمستويات منخفضة وأكثر حماية للبيئة وذلك بواسطة طرق مكافحة الحيوية. وإن أهم العوامل المستخدمة في المقاومة الحيوية ضد مسببات أمراض النبات تتمثل في بعض أنواع الفطر *Trichoderma spp.* الذي استخدم على نطاق واسع في المقاومة الحيوية وأثبت نجاحاً باهراً على بعض الأمراض (Harman, 2000) .

وقد استهدفت هذه الدراسة عزل الفطريات المسببة لمرض الذبول وعفن الحبوب الفوزاريومي في الذرة الصفراء *F. moniliforme* و *F. graminearum* من حبوب الذرة وتشخيصها وتعريفها معملياً، وكذلك اختبار كفاءة فطر التريكوثيرما *Trichoderma* كفطر حي و/أو مستحضر تجاري ضد هذه الفطريات تحت الظروف المعملية والحقلية.

مواد البحث وطرقه :

المادة النباتية: بذور ذرة صفراء صنف محلي غوطة (82) وهجين Golden west. **الكائنات الدقيقة:** عزلات من الفطر *F. moniliforme* و *F. graminearum* تم الحصول عليهما من بعض حقول الذرة الصفراء المصابة في منطقة المنصورة بالرقعة. عزلة محلية من الفطر *T. harzianum* تم الحصول عليها من معمل اكثار التريكوثيرما في اللاذقية ، المستحضر التجاري البيوكونت للفطر *T. harzianum* (19×10^7 spore/g).

أولاً : عزل الفطريات المسببة من حبوب الذرة وتعريفها معملياً :

أخذت عدة عينات من كيزان ذرة مصابة بالعفن الفوزاريومي (العفن الوردي) وتم فرط الحبوب ثم وضعت في دوارق مخروطية سعة كل منها 300 مل وغمرت في محلول الكلوراكس التجاري (هيبوكلوريد الصوديوم 0.525 %) لمدة 5 دقائق مع الرج رحوياً ثم غسلت الحبوب مرتين بالماء المقطر المعقم وجففت على ورق ترشيع معقم. نقلت بعدها الحبوب لتزرع في أطباق بتري تحوي بيئة PDA بواقع خمس حبوب في كل طبق وحضنت الأطباق عند درجة حرارة $25 \pm 2^\circ\text{C}$ لمدة 3-4 أيام وتم خلالها مراقبة النمو الفطرية (Bacon et al., 1994) ، ثم أعيد عزلها وتنقيتها وتشخيصها وتعريفها اعتماداً على مفتاح تحديد أنواع الجنس *Fusarium* (Nelson et al., 1983; Booth., 1971) ، ودرست كل من:

- 1- الخصائص المزرعية للمستعمرة (عمر أسبوع): قطر المستعمرة/سم ، وجود أو عدم وجود الميسيليوم الهوائي ولونه على سطح المستعمرة العلوي، ولون السطح السفلي للمستعمرة.
- 2- الخصائص المجهرية (عمر 3 أسابيع): وجود الأبواغ الكونيدية الصغيرة والكبيرة وشكلها وأبعادها بالمكرون، وجود الجراثيم الكلاميدية وموضعها في الخيط الفطري، وأبعادها بالمكرون.

ثانياً: اختبار القدرة المرضية لعزلات الفطريات الممرضة:

قبل اختبار القدرة المرضية للفطريات لا بد من اختبار حيوية البذور وخلوها من مسببات المرضية (الفطرية) الأخرى.

1. اختبار نسبة إنبات البذور ونسبة الإصابة الطبيعية فيها : لهذا الغرض زرعت البذور بعد تعقيمها سطحياً على ورق ترشيع مشبع بالماء ضمن أطباق بتري وحضنت على درجة حرارة $25 \pm 2^\circ\text{C}$ لمدة أسبوع. تم بعدها عد البذور السليمة وتلك التي ظهر عليها نموات فطرية ثم تم حساب نسب الانبات والإصابة الطبيعية كنسب مئوية على التوالي.

2. تحضير المعلق الجرثومي: بعد تنمية الفطر الممرض لمدة 7-10 أيام على بيئة PDA تم إضافة 5 مل ماء معقم إلى كل مزرعة فطرية وكشط الميسيليوم بقضيب زجاجي ، بعد ذلك رشح المعلق بواسطة 4 طبقات من ورق الترشيح للحصول على المعلق الجرثومي ، وتم تحديد التركيز (2×10^6) بواسطة hymocytometer حيث تم التخفيف بالماء حتى الحصول على التركيز المطلوب لإجراء العدوى.

إجراء العدوى: أضيف 2 مل من المعلق الجرثومي (2×10^6) من كل عزلة من الفطر الممرض إلى طبق بتري (9 سم) يحوي على 25 بذرة من بذور الذرة المعقمة سطحياً. أما معاملة الشاهد فيضاف لها ماء مقطر بدلاً من المعلق الجرثومي. تم التحضين على حرارة 25°C في الظلام لمدة 3-4 أيام . نقلت البذور المنتشة بعدها وزرعت في أصص بلاستيكية تحتوي تربة معقمة (في فرن الحرارة الجافة) بواقع 2 كجم تربة/ أصيص وتم زراعة البذور بواقع 5 بذور/ أصيص. تمت مراقبة النباتات بعدها لمدة 21 يوماً، وتقدير النسبة المئوية للإصابة بالاعتماد على (%) للنباتات غير المنيقة حسب السلم الموصوف بواسطة Macka (1989) كما يلي:

نسبة الإصابة	نسبة النباتات غير المنبتقة
غير مصابة	0-10%
إصابة منخفضة جداً	11-20%
إصابة منخفضة	21-40%
إصابة متوسطة	41-60%
إصابة عالية	61-80%
إصابة عالية جداً	81-100%

تم عزل الممرضات من النباتات المعدة وتعريفها مرة أخرى للتأكد من أنها هي التي أحدثت المرض (فروض كوخ).

ثالثاً: اختبار القدرة التضادية للفطر *Trichoderma spp* والمستحضر التجاري لهذا الفطر ضد الفطريات المسببة *F. moniliforme* و *F. graminearum* تحت الظروف المخبرية :

أ- الأثر المباشر على نمو هيف الفطريات الممرضة :

- استخدم لهذا الغرض تقنية الزرع المزدوج Dual culture في أطباق بتري تحتوي على بيئة PDA. حيث قسم الطبق الى قسمين متساويين ولفح مركز القسم الأول بقرص قطره 0.5 سم من مستعمرة الفطر الممرض (*F. moniliforme* أو *F. graminearum*) المنمأة على بيئة PDA عمر 7 أيام. أما القسم الثاني من الطبق البتري فيلحق بقرص قطره 0.5 سم من مستعمرة فطر المقاومة الحيوية *Trichoderma harzianum* أو البيوكونت الذي أعيد تنميته على بيئة PDA عمر سبعة أيام أيضاً . أما في معاملة المقارنة لفتح مركز القسم الأول من الطبق بالفطر الممرض أو فطر المقاومة الحيوية وكل على انفراد. تم التحضين على درجة حرارة 25±2م في الظلام لمدة 5-7 أيام تم خلالها قياس قطر المستعمرة لكل من الفطر الممرض وفطر المقاومة الحيوية بشكل يومي وتم حساب النسبة المئوية للتنشيط وفق Edgington et al. 1971 :

% للتنشيط = (متوسط أقطار النمو الفطري في المقارنة – متوسط أقطار النمو الفطري في المعاملة / متوسط أقطار النمو الفطري في المقارنة) × 100.

رابعاً: دراسة فاعلية عزلات الفطر *Trichoderma spp* ضد الفطر المسبب لذبول الذرة الصفراء *Fusarium spp* في الظروف الحقلية :

- تحضير تربة الحقل للزراعة:

تم أخذ كمية من تربة الحقل لإجراء تحليل لها لمعرفة كمية الأسمدة الواجب إضافتها , ثم حضرت مساحة (1) دونم للزراعة حيث تم حرث التربة حرث عميق بحدود 30 سم عندما كانت رطوبة الحقل كافية بعد ريها, ثم أضيفت الأسمدة حسب تحليل التربة (26 كجم يوريا / , 24 كجم سماد بوتاس/ , 22 كجم سماد فوسفوري/دسم) .

خططت التربة للزراعة و البعد بين الخط والآخر 70سم. وقسمت إلى ألواح بأبعاد (2 × 2)م وبثلاث (ألواح) مكررات لكل معاملة ثم زرعت البذور في جور على خطوط في الثلث العلوي من الخط حيث وضعت حبتان في الجورة وبمسافة 25 سم بين الجورة والأخرى وتمت الزراعة بتاريخ 10-7-2011 وتم تنفيذ المعاملات التالية:

- تأثير التريكوثيرما على تطور أعراض الإصابة بخليط من *F. moniliforme* و *F. graminearum* على الذرة الصفراء حتى مرحلة النضج :

تم تحضير ثلاث شواهد حيث تم في الأول زراعة بذار (حبوب) صافي غير معاملة في تربة الحقل وتم في الثاني زراعة حبوب معاملة بالتريكوثيرما وذلك بتغيره بالمستحضر التجاري البيوكونت wp تركيز (19 × 10⁶ جرثومة / 1 جرام) بمعدل 10 جرام/كجم بذار وتم في الثالث زراعة حبوب معدية صناعياً بخليط الفطرين *F. moniliforme*, *F. graminearum* وينسب متساوية حيث أضيف المعلق الجرثومي للفطر *F. moniliforme* حجم (40) مل تركيز (2 × 10⁶) إلى المعلق الجرثومي للفطر *F. graminearum* حجم (40) مل تركيز (2 × 10⁶) وتمت العدوى بنقع الحبوب بالمعلق الجرثومي لهما مدة 48 ساعة وبثلاث مكررات لكل معاملة .

يقابل هذه الشواهد زراعة نفس المعاملات السابقة مع إضافة المستحضر التجاري (البيوكونت) حبيبات للفطر *T. harzianum* قبل الزراعة عندما كانت رطوبة التربة كافية بمعدل 1 كجم / دسم .

وتم حساب :

1- نسبة الانبات :تم حسابها بعد 3 أيام و6 أيام و9 أيام من الزراعة .

2-نسبة الإصابة : تم حسابها عند ظهور أول علامة للمرض ثم كل 15 يوم حتى مرحلة النضج. اعتماداً على

$$P = \frac{n.100}{N}$$

المعادلة:

حيث : P - نسبة الإصابة كنسبة مئوية N. - عدد النباتات الكلي. n - عدد النباتات المصابة
3- المؤشرات الإنتاجية: تم الحصاد بالطرق اليدوية و حساب الانتاجية كجم/هكتار وذلك بأخذ (10) نباتات عشوائياً من كل مكرر مقارنة مع الشواهد .

النتائج

أولاً: عزل الفطريات المسببة من حبوب الذرة وتعريفها معملياً

(1): الفطر *F.moniliforme* :

- نمو المستعمرة : سريع وقطر المستعمرة أكثر من 7 سم بعد 10 أيام .
- الميسيليوم الهوائي: موجود ولونه أبيض مشوب بالزهرى .
- لون المستعمرة أسفل الطبق : يرتقالي ثم يصبح بنفسجي بتقدم عمر المستعمرة .
- الجراثيم الكونيدية الصغيرة (Microconidia) : غزيرة العدد شكلها بيضوي بدون حواجز في مجموعات أو سلاسل تنتج عن فياليدات أحادية وأحياناً عديدة أبعادها (2.8 m - 8.1-9 × 3).
- الجراثيم الكونيدية الكبيرة (Macroconidia): نادرة الوجود – تطلب ظهورها تعريض المستعمرات ل UV - متوسطة الطول ضيقة مستقيمة نوعاً ما لها 3-5 حواجز نهايتها القمية مستدقة والقاعدية قديمة أبعادها (3.9 m -- 3.4 × 33.3-46).
- الجراثيم الكلاميدية : غير موجودة .

(2) *F.graminearum* :

- نمو المستعمرة : سريع وقطر المستعمرة أكثر من 7 سم بعد 10 أيام .
- الميسيليوم الهوائي : موجود ولونه أبيض .
- لون المستعمرة أسفل الطبق : أحمر نبيذي .
- الجراثيم الكونيدية الصغيرة (Microconidia): غائبة .
- الجراثيم الكونيدية الكبيرة (Macroconidia): متوسطة الطول لها 3-7 حواجز شكلها اسطواناني نهايتها القمية حلمية متطاولة والقاعدية قديمة أبعادها (3.6-6.2m × 3.6-65).
- الجراثيم الكلاميدية: موجودة في سلاسل أو مجموعات أبعادها (8.4-9.2 × 10.3-12 m) .

(3) اختبار القدرة المرضية لعزلات الفطريات الممرضة :

تم قياس نسبة الانبات للسنف غوطة 82 التي بلغت (67%) ونسبة الإصابة الطبيعية التي بلغت (0%) أربع عزلات من الفطر *F.moniliforme* وثلاث عزلات من الفطر *F.graminearum* تم اختبار قدرتها المرضية في ظروف الحقل الطبيعية حيث أظهرت العزلات قدرات مرضية متباينة (الجدول 1)، حيث تراوحت درجة الإصابة من منخفضة في العزلات (fm1, fm2 , fg5, fg7) إلى متوسطة في العزلات (fm3, fm4, fg6) فيما لم تبدي معاملة الشاهد أي قدرة مرضية .

جدول (1) درجة الإصابة لعزلات الفطر *F.moniliforme* و *F.graminearum* اعتماداً على نسبة النباتات غير المنبتة

الغزلة	% للنباتات غير المنبتة	درجة الإصابة
fm1	33	إصابة منخفضة
fm2	38	إصابة منخفضة
fm3	46.5	إصابة متوسطة
fm4	52	إصابة متوسطة
fg5	29.4	إصابة منخفضة

fg6	42	إصابة متوسطة
fg7	34	إصابة منخفضة
الشاهد	4.2	غير مصابة

هذا وقد أظهرت الفطريات الممرضة درجات إصابة عالية وتمثلت الأعراض على البادرات عمر 21 يوم ببهتان واصفرار في الأوراق السفلى ثم عم الاصفرار كامل النبات ولوحظ تقزم في النباتات وذبولها وتشوهات في الأوراق وموت بعضها وبمراحل متقدمة ظهرت أعفان في منطقة الساق تم عزل المسبب المرضي منها . وهذا يتفق مع (Sutton.,1982). ولدى زرع مقاطع من جذور النباتات المصابة على بيئة PDA عند حرارة 25 °م نمت المستعمرات الفطرية وظهرت بلون أبيض مشوب بالزهرى أعلى الطبقة وبلون بنفسجي أسفل الطبقة فيما ظهرت أخرى بلون أبيض أعلى الطبقة ولون احمر نبيذي أسفله وأثبتت الدراسات المجهرية بأن العامل المسبب هو كلا من *F.moniliforme*, *F.graminium* . بعد عزل الممرضات من النباتات المعدة تم اجراء عدوى أخرى للبذور وأظهرت النباتات نفس الأعراض تم عزل المسبب المرضي منها وتعريفها مرة أخرى (فروس كوخ) .

ثانياً: اختبار القدرة التضادية لعزلات الفطر *Trichoderma.spp* ضد الفطر المسبب لذبول الذرة الصفراء *Fusarium.spp* (*F.graminearum* و *F.moniliforme*) تحت الظروف المعملية:
أ- الأثر المباشر على نمو هيف الفطريات الممرضة :

يتضح من الجدول (2) وجود قدرة تضادية عالية للمستحضر التجاري البيوكونت والعزلة *T.harzianum* مع وجود فروق معنوية بينهما ضد الفطر *F.moniliforme* و *F.graminearum* إذ بلغت نسبة التثبيط (76,4%) للبيوكونت و(72%) للعزلة *T.harzianum* ضد الفطر *F.moniliforme* فيما بلغت (73%) للبيوكونت و (70%) للعزلة *T.harzianum* ضد الفطر *F.graminearum* واحتلت فطريات المقاومة الحيوية جزءاً كبيراً من الطبقة البتري فيما احتل الفطر *Fusarium.sp* قسمًا صغيراً منه، وهذه الدراسة تتفق مع (Sivan and Chet.1989) وكذلك مع النتائج المتحصل عليها من قبل (بورغدة و رشيدة , 2011) حيث أظهرت النتائج عدم تكون منطقة فاصلة بين الغزل الفطري لمستعمرات الفطر الممرض ونمو الغزل الفطري لمستعمرات فطريات التضاد وأن الفطر المضاد *T.harzianum* , البيوكونت نما فوق الغزل الفطري للفطر الممرض مما يفسر بأن التضاد يكون من خلال آليات التطفل الفطري أي أن فطر المقاومة الحيوية (*Trichoderma spp*) يلتف حول خيوط الفطر الممرض ثم يرسل خيوط لها نهايات مدببة أو ممصات أو خطاطيف أو أعضاء التصاق تخترق غزل الفطر الممرض ثم يحلل جدرانه من خلال افراز الأنزيمات B-1-3-glucanase , Chitinase , cellulase (Harman.2000.,Chet.,Benhamou.,1997).

جدول(2) تأثير *T.harzianum* , البيوكونت على معدل النمو القطري للفطر *F.moniliforme*

المعاملة	<i>F. moniliform</i>		<i>F. graminearum</i>	
	معدل النمو القطري (سم)	% للتثبيط	معدل النمو القطري (سم)	% للتثبيط
<i>T.harzianum</i>	b1.9	72	b2	70
البيوكونت	a1.6	76,4	a1.8	73
Control	c6.8	0	c6.7	0
Mean	3.46		3.5	
% C.V	2.88		2.91	
LSD 5%	0.19		0.21	

ثالثاً: تأثير معاملة الحبوب بالفطر تريكوديرما على تطور أعراض الإصابة تحت ظروف العدوى الصناعية بخليط من *F.moniliforme* و *F.graminearum* على الذرة الصفراء حتى مرحلة النضج:

يبين الجدول (3) تأثير معاملة الحبوب بالفطر تريكوديرما على حيوية الحبوب تحت ظروف العدوى الصناعية بخليط من الفطر (*F.moniliforme* و *F.graminearum*) وكذلك تحت الظروف الاصابة الطبيعية حيث لوحظ وجود فروق معنوية بين المعاملات حيث بلغت نسبة الانبات في معاملة بذار

صافي 67.6 % وارتفعت الى 79.3% عند معاملة الحبوب بالفطر تريكوديرما وبالمستحضر التجاري بيوكونت بينما كانت نسبة الانبات في الحبوب المعدية صناعياً بخليط الفيوزاريومات 41.3% وارتفعت هذه النسبة إلى 45.3% في الحبوب المعدية والمعاملة بالبيوكونت فيما لم يكن هناك فروق عند معاملة الحبوب بالتريكوديرما أو المعاملة ب البيوكونت بدون عدوى صناعية.

جدول (3) تأثير التريكوديرما على نسبة الانبات للذرة الصفراء المصابة بخليط من الفطر (*F.graminearum* و *F.moniliforme*)

المعاملة الصف		بذار صافي	بذار معامل ب T	بذار معامل ب F	بذار صافي + البيوكونت قبل الزراعة	بذار معامل ب T + البيوكونت قبل الزراعة	بذار معامل ب F + البيوكونت قبل الزراعة
غوبة 82	3 ايام	64	70	39	68	76	44
	6 ايام	67	74	42	71	79	45
	9 ايام	70	79	42	77	82	46
Golden west	3 ايام	66	69	40	69	77	44
	6 ايام	67	75	42	72	79	46
	9 ايام	72	80	43	78	83	47
mean		c67.6	b74.5	f41.3	b72.5	a79.3	e45.3
LSD 5% للمعاملات		5.2					
% C.V		4.7					

الأحرف المختلفة تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعاملات

* *Trichoderma harzianum* = T للمستحضر التجاري البيوكونت
* F = خليط *F.moniliforme*, *F.graminearum*

كما يوضح الجدول (4) تأثير التريكوديرما على نسبة الإصابة بخليط الفطر (*F.moniliforme* و *F.graminearum*) حيث لوحظ وجود فروق معنوية بين المعاملات حيث بلغت نسبة الإصابة في المعاملة بذار صافي 4.2% في حين انخفضت إلى 1.7% عند المعاملة بالتريكوديرما والبيوكونت معاً ، وبلغت نسبة الإصابة في حالة الحبوب المعدية صناعياً بالفوزاريومات 62.2% وانخفضت إلى 57.9 عند معاملة هذه الحبوب بالبيوكونت .

المؤشرات الإنتاجية:

عند تقدير الانتاجية كجم/هكتار لوحظ وجود فروق معنوية بين المعاملات وفروق بين الأصناف ضمن المعاملة حيث بلغت الانتاجية في معاملة الشاهد "بذار صافي" 55 و 61.2 كجم/هكتار للصف غوبة 82 و للهجين Golden west على التوالي ، ووصلت الانتاجية إلى 57.6 و 66.7 كجم/هكتار عند المعاملة بالتريكوديرما والبيوكونت معاً للصف غوبة 82 و للهجين Golden west على التوالي. وفي حالة الحبوب المعدية صناعياً بخليط الفيوزاريومات بلغت الانتاجية (46.2) كجم/هكتار للصف غوبة 82 و (55.6) كجم/هكتار للهجين Golden west وارتفعت إلى 47.6 و 56.8 كجم/هكتار للصف غوبة 82 و للهجين Golden west على التوالي في عند معاملة الحبوب المعدية صناعياً بالبيوكونت (جدول 5).

جدول (4) تأثير التريكوديرما على نسبة الإصابة للذرة الصفراء المصابة بخليط من الفطر (*F.graminearum* و *F.moniliforme*)

المعاملة الصف		بذار صافي	بذار معامل ب T	بذار معامل ب F	بذار صافي + البيوكونت قبل الزراعة	بذار معامل ب T + البيوكونت قبل الزراعة	بذار معامل ب F + البيوكونت قبل الزراعة

41	0	0	45	0	0	2011/7/25	غوة 82

الصفة	بذار صافي	بذار معاملة T ب	بذار معاملة F ب	بذار صافي + البيوكونت قبل الزراعة	بذار معاملة ب +T البيوكونت قبل الزراعة	بذار معاملة ب +F البيوكونت قبل الزراعة
غوة 82	i55	h56.4	m46.2	g56.6	e57.6	k47.6
Golden west	d61.2	c63.5	n55.6	b65.4	a66.7	f56.8
mean	D58.1	C60	F50.9	B61	A62.1	E52.2
LSD 5% للصنف	26	10	2.48	4.9	5	0.14
LSD 5% للمعاملات	2.06					
c.v	2.28	1.47	2.13	2.23	3	1.42
Golden west	2011/8/10	0	0	56	0	51
	2011/8/25	0	0	67	0	62
	2011/9/10	9	4	78	4	73
	2011/9/25	14	8	84	9	79
	2011/7/25	0	0	41	0	38
	2011/8/10	0	0	50	0	45
	2011/8/25	0	0	59	0	56
	2011/9/10	7	3	67	3	63
	2011/9/25	12	6	75	7	71
	mean	b4.2	a2.1	f62.2	a2.3	c57.9
LSD 5% للمعاملات	0.62					
% C.V	12.3					

أحرف المختلفة تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعاملات

* *Trichoderma harzianum* = T للمستحضر التجاري البيوكونت

* F = خليط *F.moniliforme*, *F.graminarum*

جدول (5) تأثير المعاملات على الإنتاجية كغ/هكتار للصنف غوة 82 والصنف Golden west .

الأحرف الصغيرة المختلفة تشير إلى وجود فروق بين الأصناف والأحرف الكبيرة إلى وجود فروق بين المعاملات

* *Trichoderma harzianum* = T للمستحضر التجاري البيوكونت

* F = خليط *F.moniliforme*, *F.graminarum*

الاستنتاجات :

1- أعطت التريكوثيرما قدرات تضادية عالية وأن المستحضر التجاري البيوكونت أفضل قدرة تضادية من العزلة المحلية *T.harzianum*.

2- زادت نسبة انبات البذور بزيادة تركيز راشح التريكوثيرما .

3- المعاملة بالتريكوثيرما أدت إلى تخفيض في نسبة الإصابة بالفئوزاريوم وزيادة في الإنتاجية .

4- الصنف (Golden west) أعطى إنتاجية أعلى وأكثر مقاومة للفئوزاريوم من الصنف (غوة 82) .

التوصيات :

1- معاملة البذور بالتريكوثيرما واستخدام البيوكونت قبل الزراعة لزيادة نسبة الإنبات والإنتاجية وخفض الإصابة بالمسببات المرضية المرافقة للبذور .

2- استخدام أصناف من هجن مقاومة للمرض ذات إنتاجية عالية.

المراجع

- العيان طلال ؛ الخليفة طه , 2003 - انتاج محاصيل الحبوب والبقول . مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية , جامعة حلب , 377 صفحة.
- بورعدة هدى ؛ رشيدة رنان , 2011 - دراسة القدرة التضادية في المختبر لبعض أنواع *Trichoderma spp* ازاء بعض عزلات الفطر *Fusarium spp* المسبب لمرض الجرب على سنابل القمح . مجلة وقاية النبات العربية, المجلد 29, العدد 140 ص , 59-51 .
- Bacon, C. W.; Yates, I. E.; Hinton, D. M. and Meredith, F., 2001. Biological control of *Fusarium moniliforme* in Maize Environmental Health Perspectives, 109 (SUPPL. 2): 325-332.
- Bacon C. W.; Hinton D. M. and Richardson M.D., 1994. A corn seedling test for resistance to *Fusarium moniliforme*. *Plant Disease* 78: 302-305.
- Booth, C . 1971. The Genus *Fusarium*. Commonwealth Agricultural Bureaux, the Eastern Press Limited, London, England. 154 P.
- Bunchenauer , H. 1998. Biological control of soil-borne diseases by rhizobacteria. *Journal of Plant Diseases and Protection*, 105 (4): 329-348.
- Edgington, L.V.; Khew, K. L. and Barron, G. L. 1971. Fungitoxic spectrum of benzimidazole compounds. *Phytopathology* 61:42-44.
- FAO., 2010. FAOSTAT Database, Food and Agriculture Organisation. WWW.FAO.ORG.
- Harman, G. E. 2000 . Myths and dogmas of biocontrol changes in perception derived from *Trichoderma harizianum* strain T-22. *Plant Disease*, 84(4): 377-393 .
- Macka, M. 1989. Fusaria as pathogens of cereal seedling, p. 329—355, in: Chelkowski, J. (ed.), *Fusarium Mycotoxins, Taxonomy and Pathogenicity*, Elsevier, Amsterdam—Oxford—New York—Tokyo, 492.
- Macdonald, M. V. and Chapman, R. 1997. The incidence of *Fusarium moniliforme* on maize from Central America, Africa and Asia during 1992–1995. *Plant Pathology* (46): 112–125.
- Nelson, P. ; E-tosson, T. A. and Marasas, F. O., 1983. fusarium species an Illustrated manual for identification Pennsylvania state univ. press university park PA, 193 P.
- Sivan, A. and Chet, I. 1989. The possible role completion between *Trichoderma harizianum* and *F.oxysporum* on Rhizospher colonization . *Phytopathology*. 79 (2) : 198-202.
- Sprague, G. F. and Dudley, J. W. 1988. Corn and Corn Improvement. Third Edition,
- Sutton, J.C. 1982. Epidemiology of wheat head blight and maize ear rot caused by *Fusarium graminearum*. *Canadian Journal of Plant Pathology* 4:195-209.
- Sydenham, E. W.; Gelderblom, W. C. A.; Thiel, P.G. and Marasas, W. F. O. 1990. Evidence for the natural occurrence of fumonisin B1, a mycotoxin produced by *Fusarium moniliforme* in corn. *Journal of Agricultural and Food Chemistry* 38 (1): 285-290.

EFFECT OF *Trichoderma* spp. ON MAIZE INFECTIOUS BY *FUSARIUM*

AL-Ahmed, J.¹ and A. A. Al-Rafdi²

¹ Fac. of Agric., Alfurat Univ., AL Raqqa, Syria

²Dep. Plant Protection, Fac. of Agric., Alfurat Univ., Dier ezzor. Corresponding author: alrafdi@gmail.com

ABSTRACT

Fusarium moniliforme and *Fusarium graminearum* were isolated from infected maize grains and then identified by microscope. Isolates of these fungi showed differential pathogenicity. Antagonism of *Trichoderma harzianum* as living fungus and biocont were tested *in vitro* and *in vivo*. Significant differences in radial growth were found *in vitro* where inhibition was 76.4% for biocont and 72% for *T.harzianum* isolate against *F. moniliforme*. Meanwhile, it was 73% and 70% for biocont and *T.harzianum* isolate respectively against *F. graminearum*. In *vivo*, significantly improve was found in germination percentage in case of grain treatment with biocont and *T.harzianum* isolate (79.3%) compared with 67.6 % of control. Also, these results showed noticeable decrease in infection percentage from 62.2 % in case of artificially inoculated seeds by *Fusarium* spp. to

57.9% in case of artificially inoculated seeds and treated with biocont. The productivity of cultivar Ghota (82) increased from 55kg/hectar in untreated seeds to (57.6) kg/hectar in seeds treated with *Trichoderma* and biocont , and from 46.2kg/hectar in seeds inoculated with *Fusarium* spp. to (47.6) kg/hectar in seeds inoculated with *Fusarium* and treated with biocont .

keywords: *F.moniliforme* , *F.graminearum* , *Trichoderma* , biocont , Maize

قام بتحكيم البحث

أ.د / عايد حافظ عفيفي

أ.د / عبد الودود زكي عاشور

كلية الزراعة – جامعة المنصورة

مركز البحوث الزراعية